

# 复旦大学数学科学学院

## 2015~2016 学年第二学期期末考试试卷

### A 卷

课程名称: 高等数学 (A) (下)                      课程代码: MATH120002

开课院系: 数学科学学院                      考试形式: 闭卷

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

1. (本题共 40 分, 每小题 5 分) 计算下列各题

(1) 设  $z = xye^{x^2+y^2}$ , 求  $z''_{xy}$ 。

解:  $z'_x = y(1+2x^2)e^{x^2+y^2}$ ,  $z''_{xy} = (1+2x^2)(1+2y^2)e^{x^2+y^2}$ 。

(2) 解方程  $y'' - 3y' + 2y = x^2$ 。

解: 对应齐次方程有通解  $y = c_1e^x + c_2e^{2x}$ , 设原方程的一个特解为

$y^* = ax^2 + bx + c$ 。代入原方程,  $2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) = x^2$ ,

得  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}, c = \frac{7}{4}$ ,

故原方程的通解  $y = c_1e^x + c_2e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{4}$ 。

(3) 求椭球面  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$  在点  $(1, -1, 1)$  处的切平面方程。

解: 记  $F(x, y, z) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} - 1$ , 则  $F'_x = x, F'_y = \frac{y}{2}, F'_z = \frac{z}{2}$ ,

在点  $(1, -1, 1)$  处的切平面方程为  $2(x-1) - (y+1) + z - 1 = 0$ 。

(4) 求函数  $u = x^2 + y^2 - 8x + 4y$  在  $D: x^2 + y^2 \leq 9$  上的最值。

解: 先求驻点,  $u'_x = 2x - 8, u'_y = 2y + 4$ , 得驻点  $(4, -2)$ , 该点不在  $D$  内, 所以函

数在  $D$  内无驻点, 这表明, 函数在  $D$  上的最值应在边界  $\partial D: x^2 + y^2 = 9$  上取到。

姓 名: \_\_\_\_\_ 学 号: \_\_\_\_\_ 专 业: \_\_\_\_\_

( 装订线内 不要答题 )

令  $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = 3\sin t \end{cases}$ , 代入函数得  $u = 9 - 24\cos t + 12\sin t$ , 所以函数的最大值

$$u_{\max} = 9 + 12\sqrt{5}, \text{ 最小值 } u_{\min} = 9 - 12\sqrt{5}.$$

(5) 计算  $\int_L (x+y)ds$ , 其中  $L: x^2 + y^2 = 2x$ .

解: 由对称性,  $\int_L yds = 0$ , 令  $\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$

$$\text{所以 } \int_L (x+y)ds = \int_0^{2\pi} (1 + \cos t)dt = 2\pi.$$

(6) 计算  $\iiint_{\Omega} (x+y+z)dxdydz$ , 其中  $\Omega: (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 1$ .

解: 作坐标平移  $\begin{cases} u = x-1 \\ v = y-1 \\ w = z-1 \end{cases}$ , 则由对称性,

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega'} (3+u+v+w)dudvdw = \iiint_{\Omega'} 3dudvdw = 4\pi, \text{ 其中 } \Omega': u^2 + v^2 + w^2 \leq 1.$$

(7) 讨论级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n}$  收敛性。

解: 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n} \Big/ \frac{1}{n} = +\infty$ , 而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, 由比较判别法, 原级数发散。

(8) 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n} (x-1)^n$  的收敛半径与收敛区间。

解:  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} \Big/ \frac{n^3}{3^n} = \frac{1}{3}$ , 所以收敛半径  $R = 3$ ,

当  $x = -2$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^3$  发散,

当  $x = 4$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$  发散, 所以收敛区间为  $(-2, 4)$ 。

2. (本题共 10 分) 求级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$  的和。

解：讨论幂级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)} x^n$ ，其收敛半径  $R=1$ ，收敛区间为  $[-1,1]$ 。

$$\text{记 } S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)} x^n, \quad x \in [-1,1],$$

$$\begin{aligned} \text{则 } S(x) &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n = \frac{x}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} x^{n-1} - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\ &= -\frac{x}{2} \ln(1-x) + \frac{1}{2x} \ln(1-x) + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} x, \quad x \in (-1,0) \cup (0,1), \end{aligned}$$

$$\text{于是 } S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2, \quad \text{即 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2.$$

3. (本题共 10 分) 求  $\int_L (2x \sin y + y) dx + (x^2 \cos y + 2x) dy$ ，其中  $L: x^2 + y^2 = 2ax \ (a > 0)$

从  $(0, 0)$  到  $(2a, 0)$  的上半圆周。

$$\text{解：补充由对称性， } L_1: y=0, x: 2a \mapsto 0, \quad \int_{\Gamma} x^2 ds = \int_{\Gamma} y^2 ds = \int_{\Gamma} z^2 ds,$$

$$\text{则由 Green 公式， } \int_{L+L_1} (2x \sin y + y) dx + (x^2 \cos y + 2x) dy = -\iint_D dx dy = -\frac{1}{2} \pi a^2,$$

$$\text{而 } \int_{L_1} (2x \sin y + y) dx + (x^2 \cos y + 2x) dy = \int_{2a}^0 0 dx = 0,$$

$$\text{所以 } \int_L (2x \sin y + y) dx + (x^2 \cos y + 2x) dy = -\frac{1}{2} \pi a^2.$$

4. (本题共 10 分) 求球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \ (a > 0)$  被平面  $z = \frac{a}{4}$  与  $z = \frac{a}{2}$  所夹部分的面积。

$$\text{解：设所夹部分为 } \Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \left( \frac{3}{4} a^2 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{15}{16} a^2 \right),$$

$$\text{则 } z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

$$\begin{aligned} \text{于是所求面积 } A &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{15}}{4}a} \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \frac{1}{2} \pi a^2, \end{aligned}$$

其中  $D: \frac{3}{4}a^2 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{15}{16}a^2$ 。

5. (本题共 10 分) 计算  $\iint_{\Sigma} (x + y^2z)dydz + (4y + 1)dzdx + zdx dy$ , 其中  $\Sigma$  为曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$  的下侧。

解: 设有向曲面  $\Sigma_1: z = 1 (x^2 + y^2 \leq 1)$ , 取上侧。

由 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_1} (x + y^2z)dydz + (4y + 1)dzdx + zdx dy = \iiint_{\Omega} 6dxdydz = 2\pi。$$

$$\text{而 } \iint_{\Sigma_1} (x + y^2z)dydz + (4y + 1)dzdx + zdx dy = \iint_{\Sigma_1} dx dy = \pi,$$

$$\text{于是 } \iint_{\Sigma} (x + y^2z)dydz + (4y + 1)dzdx + zdx dy = \pi。$$

6. (本题共 10 分) 设  $f(x) = \sin(ax), x \in [-\pi, \pi] (a \text{ 不取整数})$ , 求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数  $S(x)$ 。

解:  $a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots,$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin ax \sin nxdx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(a-n)x - \cos(a+n)x)dx \\ &= \frac{(-1)^n 2n \sin a\pi}{(a^2 - n^2)\pi}, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

所以  $f(x)$  的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{2 \sin a\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{a^2 - n^2} \sin nx。$$

由收敛性定理, 可知其和函数

$$S(x) = \begin{cases} \sin ax, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pm\pi \end{cases}。$$

7. (本题共 10 分) 设可微函数  $f(x)$  是方程  $(x - 2y^3)dx + 3xy^2 dy = 0$  的解且  $f(1) = 1$ ,

(1) 求  $f(x)$  的表达式; (2) 讨论级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$  收敛性。

解: (1) 令  $z = y^3$ , 方程可改写为  $z' - \frac{2}{x}z = -1$ , 解得  $z = x + cx^2$ , 由  $x = 1$  时,  $y = 1$

可知  $c=0$ ，所以  $f(x)=\sqrt[3]{x}$ 。

$$(2) \text{ 级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n},$$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\ln n}}{(\frac{\ln n}{2})^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\{\ln^2 n - n \ln \frac{\ln n}{2}\},$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\{\sqrt{n}(\frac{\ln^2 n}{\sqrt{n}} - \sqrt{n} \ln \frac{\ln n}{2})\} = 0,$$

可得 当  $n$  充分大时,  $\frac{n^{\ln n}}{(\frac{\ln n}{2})^n 2^n} < \frac{1}{2^n}$ , 所以由比较判别法,  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{\ln^n n}$  收敛,

即  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$  收敛。